

СТЕПНАЯ (СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ) ЧЕРЕПАХА

Testudo horsfieldi



Класс - пресмыкающиеся
(*Reptilia*)

Отряд – черепахи (*Testudines*)

Семейство - сухопутные черепахи
(*Testudinidae*)

Род - наземные черепахи
(*Testudo*)

Панцирь среднеазиатской черепахи невысокий, округлый, желтовато-бурого цвета, с расплывчатыми темными пятнами. Размеры черепахи не превышают обычно 20 см (рекордный экземпляр — 29 см). Самки среднеазиатской черепахи в среднем заметно крупнее самцов. На передних ногах среднеазиатской черепахи— по 4 пальца.

Распространение: в южных районах Казахстана, по всей равнинной Средней Азии; в Северо-Восточном Иране, Афганистане, северо-западных районах Индии и Пакистана.

Обитает в глинистых и песчаных пустынях с зарослями полыни, саксаула, в предгорьях до высоты 1200 м.

Питается всходами дынь, арбузов, пшеницы, хлопка и т.п., мелкими насекомыми. Охотно в жару пьют воду.

Ранней весной черепахи выходят из убежищ. В мае - июне самки откладывают по 2 - 5 яиц длиной до 5 см. В августе - октябре вылупляются черепашки и зимуют в земле, выходят на поверхность следующей весной

Спариваются черепахи с февраля по август. Самка откладывает от 2 до 6 яиц. К 20 - 30 годам достигает длины 18 - 20 см и веса 1,5 - 2 кг.

В природе среднеазиатская черепаха питается растениями пустыни, бахчевыми культурами, всходами многолетних трав и кустарников, ягодами и падалицей фруктов в садах.

