

СЕРАЯ ВОРОНА

(лат. *Corvus*)



Класс: Птицы (*aves*)

Отряд: Воробьинообразные

(*Passer – sicut*)

Семейство: Врановые (*Corvidae*)

Род: Вороны (*Corvus*)

Распространение. Представители этого рода встречаются на всех континентах, за исключением Южной Америки и Антарктиды, и на некоторых островах. Род воронов составляет около трети всех видов в семействе врановых. Недавние исследования показали, что некоторые виды воронов способны не только использовать орудия труда, но и создавать их. Вороны в настоящее время считаются одними из самых умных животных в мире.

Внешний вид. Оперение всех видов воронов преимущественно чёрное или чёрно-серое, иногда с белыми участками. Тело крепкое с сильными клювом и ногами. Половой диморфизм слабо выражен.

Питание. Серых ворон можно назвать всеядными птицами, хотя их желудки по большей части приспособлены к перевариванию растительной пищи. Их ежедневный рацион составляют следующие ингредиенты: зёрна, орехи; различные древесные плоды и корни; овощи, фрукты, которые могут таскать с огородов; мелкие грызуны – мыши, детеныши крыс, землеройки. Реже кроты; жуки и личинки, земляные черви; яйца других птиц – серые вороны охотно разоряют чужие гнезда; падаль – они не брезгают поедать умерших животных или доедать за другими хищниками; мусорные отходы – городские серые вороны часто роются в мусорных баках.

Размножение. Сезон размножения выпадает на весну. Иногда серые вороны образуют устойчивые пары, но это редкость. В загрязненной местности серые вороны не гнездятся, а ищут территорию чище. В свое гнездо эти птицы никогда не стаскивают мусор. Это обеспечивает рождение здоровых птенцов. Серая ворона делает кладку в начале июля – это от двух до шести голубых или зеленых яиц с мелкими темными пятнами. Спустя три недели появляются птенцы.